

# 定期予防接種カレンダー

ワクチン	接種回数	標準的な期間	乳児期									幼児期						学童期									
			6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	1歳	1歳6ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳～	高1			
ロタウイルス ワクチン	ロタリックス（1価）：計2回 27日以上の間隔をおいて経口接種	初回は 生後6週～14週6日 まで	①	②																							
	ロタテック（5価）：計3回 27日以上の間隔をおいて経口接種		①	②	③																						
B型肝炎 (HBV)	計3回 27日以上の間隔をおいて2回 1回目から139日以上(20～24週) 間隔をおいて1回	生後2～9か月未満	①	②					③																		
小児用肺炎球菌	計4回 初回3回：27日以上の間隔をあける 追加1回：初回接種終了後60日以上間隔をおいて1歳以降に接種	初回は 生後2～7か月未満 ※1	①	②	③							④													5歳未満		
五種混合 (DPT-IPV-Hib) ジフテリア：D 百日せき：P 破傷風：T ポリオ：IPV ヒブ：Hib	計4回 初回3回：20日以上(標準的には20～56日)間隔をあける 追加1回：初回3回終了後6か月以上(標準的には1年～ 1年6か月)間隔をおいて接種	生後2か月～1歳で 初回3回を接種	①	②	③								④												7歳6か月未満		
BCG	1回	生後5～8か月未満							①																		
麻しん・風しん (MR) ※2	計2回 1回目：1歳以上2歳未満 2回目：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間に接種	1歳誕生日がきたら 早めに受けましょう！												①											② 注意	年長(年度内に6歳になる者) ～ 小学校就学まで	
水痘 (水ぼうそう)	計2回 3か月以上(標準的には6～12か月)間隔をあける	初回は1歳～ 1歳3か月未満												①	②											3歳未満まで	
日本脳炎 ※2	1期初回2回：6日以上(標準的には6～28日)間隔をあける	3歳																									
	1期追加：初回終了後6ヵ月以上(標準的には1年)間隔をあける	4歳																									
	2期：1回	9歳																									
二種混合 (DT) ※2	1回	11歳																								①	13歳未満
ヒトパピロウイルス (HPV)	計3回 小6～高1の女子 ガーダシル or サーバリックス or シルガード9	中1																									①②③

※1 初回接種が7か月未満に完了しなかった場合は、接種回数が異なります。お問い合わせください。

※2 MR・日脳・二種混合2期の予診票は接種対象の時期に個別案内いたします。

● 詳しい情報は国立感染症研究所/予防接種スケジュール <http://www.nih.go.jp/niid/ja/schedule.html>

①②などの数字はワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

☐ は定期接種として接種が可能な年齢範囲です。

実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ小児科にご相談ください。

● 任意接種については「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」 <http://www.jpeds.or.jp/>