

定期予防接種カレンダー

ワクチン	接種回数	標準的な期間	妊娠	乳児期									幼児期						学童期										
			28～ 36週6日	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 歳	1 歳 2 か 月	1 歳 6 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11歳～	高1			
ロタウイルス ワクチン	ロタリックス（1価）：計2回	初回は 生後6週～14週6日 まで			①	②		生後24週（5か月半）まで						医療機関によりワクチン の種類が異なります															
	ロタテック（5価）：計3回	27日以上の間隔を おいて経口接種			①	②	③	生後32週（7か月半）まで																					
B型肝炎 (HBV)	計3回 27日以上の間隔を おいて2回 1回目から139日以上(20～24週) 間隔を おいて1回	生後2～9か月未 満			①	②				③																			
小児用肺炎球菌	計4回 初回3回：27日以上の間隔をあける 追加1回：初回接種終了後60日以上間隔を おいて1歳以降に接種 ※1	初回は 生後2～7か月未 満 ※1			①	②	③						④													5歳未 満			
五種混合 (DPT-IPV-Hib) <small>ジフテリア：D 百日せき：P 破傷風：T ポリオ：IPV</small>	計4回 初回3回：20日以上(標準的には20～56日)間 隔をあける 追加1回：初回3回終了後6か月以上(標準的 には1年～1年6か月)間隔を おいて接種	生後2か月～1歳で 初回3回を接種			①	②	③						④													7歳6 か月未 満			
BCG	1回	生後5～8か月未 満						①																		1歳未 満			
麻しん・風しん (MR) ※2	計2回 1回目：1歳以上2歳未 満 2回目：5歳以上7歳未 満で小学校就学前の1年間に接種	1歳誕生日がきたら 早めに受けましょう！											①													2歳未 満	② 注 意	年長（年度内に6歳になる者） ～ 小学校就学まで	
水痘 (水ぼうそう)	計2回 3か月以上(標準的には6～12か月)間隔を あける	初回は1歳～ 1歳3か月未 満											①	②													3歳未 満まで		
日本脳炎 ※2	1期初回2回：6日以上(標準的には6～28日)間 隔をあける	3歳																											
	1期追加：初回終了後6ヵ月以上(標準的には1年)間 隔をあける	4歳																											
	2期：1回	9歳																											
二種混合 (DT) ※2	1回	11歳																										①	13歳 未 満
ヒトパピロウイルス (HPV)	計3回 小6～高1の女子	中1																											①②③
RSウイルス	1回 出産日の14日前までに接種完了	妊娠28週～36週6日																											

※1 初回接種が7か月未満に完了しなかった場合は、接種回数が異なります。お問い合わせください。

※2 MR・日脳・二種混合2期の予診票は接種対象の時期に個別案内いたします。

● かわいい情報は国立感染症研究所/予防接種スケジュール <http://www.nih.go.jp/niid/ja/schedule.html>

①②などの数字はワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

□ は定期接種として接種が可能な年齢範囲です。

実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ小児科にご相談ください。

● 任意接種については「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」 <http://www.jpeds.or.jp/>